

*Apis  
mellifera  
mellifera*





## L'ABEILLE NOIRE DES LANDES DE GASCOGNE



### Historique

Des écrits attestent de l'abondance des abeilles domestiques dans les Landes de Gascogne depuis plusieurs siècles : vers 1150 le guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle décrit « un pays désolé où l'on manque de tout dans cette plaine sablonneuse qui abonde cependant de miel, millet et porc ». Les ruches, comme le bétail, étaient **transmises par héritage** ou par dot. On évalue à 56 000 le nombre de ruches en 1875, puis 15 000 vers 1900 du fait de la disparition des landes à bruyère lors de la plantation des pins. Le rucher, dénommé « **apié** », pouvait compter jusqu'à 100 ou 200 ruches.

Dans les années 2000, des premières analyses génétiques dans la région des Landes de

Gascogne ont confirmé la présence d'**abeille noire locale**.

### Morphologie

L'abeille noire des Landes est une variété locale qui, durant des milliers d'années, s'est **adaptée à la floraison des bruyères** et notamment d'une « fausse » bruyère, la **callune** qui fleurit à la fin de l'été – début de l'automne. La ponte des reines s'est calée sur le cycle de la végétation permettant d'avoir un maximum de butineuses au moment des floraisons de cette callune.

L'abeille noire (*Apis mellifera mellifera*) est caractérisée par un corps foncé, avec toutefois parfois des petites taches brunes sur l'abdomen et une **pilosité plus importantes** que d'autres sous-espèces.

### Population

Depuis 2019, un programme de conservation a été démarré par le Conservatoire des Races d'Aquitaine et l'association de l'Abeille Noire des Landes. Une zone conservatoire a vu le jour depuis 2020 avec **une quarantaine de colonies** d'abeilles locales qui peuplent un rucher conservatoire.

